

01 - Ao tratar a abstinência alcoólica com benzodiazepínico, como diazepam ou clordiazepóxido, além da diminuição da agitação, qual é o outro efeito clínico importante associado a essa droga no *delirium tremens*?

- A) Aumento do limiar para crise convulsiva.
- B) Aumento significativo da confusão mental.
- C) Aumento do limiar para parada respiratória.
- D) Aumento do risco de parada cardíaca.

02 - Em relação ao uso de Oseltamivir no tratamento da Influenza, analise as seguintes assertivas:

- I. A droga deve ser prescrita na dose de 75 mg 2x/dia por 5 dias.
- II. Náuseas e vômitos podem ser minimizados se a droga for ingerida com a alimentação.
- III. Reduz a duração dos sintomas nos casos de Influenza não complicada e, se iniciado dentro de 2 dias, do início dos sintomas.
- IV. Tem sido associado a alterações psiquiátricas em pacientes com mais de 70 anos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas I, II e III.

03 - Qual das vacinas abaixo está contraindicada para um paciente em quimioterapia?

- A) Rubéola.
- B) Hepatite B.
- C) Tétano.
- D) Influenza.

04 - Em relação às dislipidemias, é correto afirmar que:

- A) A farmacoterapia para otimização de HDL colesterol e triglicerídios tem menos impacto do que a direcionada para LDL colesterol.
- B) Hipotireoidismo, síndrome nefrótica e doença hepática grave são causas identificáveis de aumento do LDL colesterol.
- C) O paciente com hipercolesterolemia isolada beneficia-se de dieta com restrição de carboidratos simples.
- D) O principal objetivo do tratamento das dislipidemias é a redução do LDL colesterol.

05 - Na pancreatite necrotizante, é correto afirmar que o uso de antibióticos está indicado:

- A) Para profilaxia em todos os pacientes.
- B) Para os pacientes que iniciarem suporte nutricional parenteral.
- C) Quando houver suspeita de sepse enquanto aguardamos os resultados das culturas.
- D) Para os pacientes que necessitam de CPRE (congiopancreatografia endoscópica retrógrada).

06 - Mulher, 34 anos, tabagista, procura atendimento por dor importante em membro inferior direito, com alteração para deambular, de início súbito. No momento da consulta, iniciou com falta de ar progressiva e dor com piora na inspiração profunda. Refere ser hipertensa e está com níveis pressóricos controlados. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Tromboembolismo pulmonar.
- B) Crise de asma.
- C) Pneumonia por aspiração.
- D) Aneurisma dissecante da aorta.

07 – Quais das situações abaixo são as mais comuns no diagnóstico diferencial de crise convulsiva?

- A) Desordens psicogênicas e enxaqueca.
- B) Síncope e desordens psicogênicas.
- C) Hipoglicemia e síncope.
- D) Enxaqueca e Ataque Isquêmico Transitório (AIT).

08 - A hepatite B é decorrente da infecção pelo vírus B (HBV), sobre ele são feitas as seguintes afirmações:

- I. O HBV é um vírus de RNA que pertence à família *Flaviviridae*. Sua transmissão ocorre fundamentalmente por via parenteral.
- II. No acompanhamento do paciente com hepatite B, o aparecimento do anti-HBs e o desaparecimento do HBsAg e da carga viral indicam resolução da infecção pelo HBV na maioria

dos casos.

III. A cirrose é condição predisponente para o surgimento de Carcinoma Hepatocelular (CHC), porém casos de CHC em portadores HBV podem ocorrer na ausência de cirrose.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

09 – Em que momento um paciente que foi internado para o tratamento de pneumonia bacteriana sem complicações deve ser reavaliado com raio-X de tórax?

- A) No dia da alta hospitalar.
- B) Em 1-2 semanas após a alta hospitalar.
- C) Em 2-3 semanas após a alta hospitalar.
- D) Em 4-6 semanas após a alta hospitalar.

10 – Mulher, 54 anos, diabética e hipertensa. Apresenta níveis controlados de glicemia. Picos pressóricos frequentes de pressão arterial sistólica acima de 200 mmHg e diastólica acima de 140 mmHg há 1 ano. Uso abusivo de sal. Tabagista com consumo aproximado de 40 cigarros/dia. Em uso de metformina 2 g/dia e hidroclorotiazida 25 mg/dia. Retorna à consulta clínica com os seguintes exames:

Glicemia de jejum = 143 mg/dL; Creatinina = 3,2 mg/dL; EQU com proteinúria.

Qual a conduta inicial mais apropriada com base nos exames acima?

- A) Restringir sal da dieta e encaminhar para diálise.
- B) Orientar restrição de sal; suspender tabagismo; suspender metformina e hidroclorotiazida e modificar o tratamento anti-hipertensivo.
- C) Otimizar o tratamento anti-hipertensivo e aumentar a dose de metformina.
- D) Manter os tratamentos vigentes e investigar nefropatia diabética.

11 – Vítima de trauma por atropelamento é atendida por equipe do SAMU. Ao chegar ao local, a equipe encontra a paciente inconsciente e com fratura exposta na perna esquerda, além de um ferimento cortocontuso na face. A primeira conduta é:

- A) Garantir via aérea.
- B) Imobilização da fratura.
- C) Sutura do ferimento.
- D) Passar um cateter venoso central.

12 – Ferimento cortocontuso no hálux esquerdo com sangramento ativo. No serviço de emergência, é constatada a necessidade de suturar. Por ordem, os procedimentos a serem realizados são:

- A) Anestesia com vasoconstritor, antissepsia, sutura e curativo.
- B) Antissepsia, anestesia sem vasoconstritor, sutura e curativo.
- C) Anestesia sem vasoconstritor, antissepsia, sutura e curativo.
- D) Antissepsia, anestesia com vasoconstritor, sutura e curativo.

13 – Homem, 60 anos, em acompanhamento de hepatite por vírus C, vem à consulta de rotina com queixa de emagrecimento, febre baixa e dor abdominal em epigástrio com cerca de 2 meses de evolução. Assinale a alternativa que contenha os métodos diagnósticos iniciais para este paciente.

- A) Ecografia abdominal e alfa-feto proteína.
- B) Antígeno carcino embrionário e alfa feto proteína.
- C) Tomografia computadorizada de abdome e transaminases.
- D) Ressonância magnética de abdome e antígeno carcino embrionário.

14 – Paciente que está sendo submetido à drenagem de abscesso com anestesia local refere, durante o procedimento, gosto metálico na boca. A hipótese mais provável para esse sintoma é reação:

- A) Normal devido à ansiedade do paciente.
- B) Alérgica ao anestésico local.
- C) Resultante de intoxicação anestésica.
- D) À injeção do anestésico em meio ácido devido ao processo infeccioso local.

15 - Qual das alternativas abaixo faz parte do conjunto de complicações de uma cirurgia bariátrica?

- A) Artrose de coluna.

- B) Osteomielite joelho.
- C) Insuficiência cardíaca.
- D) Doença desmielinizante de nervos periféricos.

16 - Dos diagnósticos abaixo, qual o que NÃO é considerado fator de risco para carcinoma de cólon?

- A) Síndrome de Peutz-Jeghers.
- B) História familiar.
- C) Adenoma viloso.
- D) Pólipo hiperplásico.

17 - Durante um plantão em uma unidade móvel do SAMU, o plantonista se depara com o atendimento a um paciente queimado, retirado de uma residência em chamas por integrantes do Corpo de Bombeiros. Em relação a este atendimento, assinale a assertiva correta:

- A) A rouquidão progressiva é um sinal de obstrução iminente das vias aéreas e a intubação orotraqueal deve ser feita precocemente.
- B) O uso de compressas umedificadas em água gelada diminui a profundidade e a gravidade das queimaduras.
- C) A reposição endovenosa de potássio deve ser iniciada o mais precocemente possível com o intuito de se prevenir arritmias cardíacas.
- D) Deve-se evitar a retirada de adornos (anéis, relógios, joias) neste atendimento pré-hospitalar, pois pode haver uma progressão da lesão.

18 - Considerando uma paciente jovem e assintomática, em qual das situações abaixo há indicação absoluta para colecistectomia?

- A) Cálculo único, de 4 cm, na vesícula.
- B) Vesícula em porcelana.
- C) Cálculos múltiplos na vesícula.
- D) Pólipo de 0,7 cm na vesícula.

19 – Paciente de 68 anos, sexo masculino, comerciante, informa ser portador de doença hemorroidária há vários anos. No início apresentava sangramento discreto e dor, evoluindo atualmente para exteriorização em todas as evacuações, que requerem manobras digitais para sua redução. Prurido moderado. Como comorbidade apresenta diabetes insulino dependente e relato de valvuloplastia. Em relação a este paciente assinale a afirmativa CORRETA:

- A) Se for optado pelo tratamento cirúrgico, apesar de ser uma operação orificial, há indicação de antibiótico profilático.
- B) A confirmação do diagnóstico à inspeção e toque anais dispensa a realização de endoscopia.
- C) É o paciente ideal para tratamento por ligadura elástica das varizes hemorroidárias.
- D) Esta doença é classificada como sendo de IV grau, com indicação de tratamento cirúrgico.

20 - Paciente masculino, 45 anos, dá entrada no pronto socorro com quadro de melena e hematêmese com início hoje pela manhã. Familiares relatam ser o segundo episódio de sangramento digestivo em 30 dias. História de etilismo estando sem uso de álcool desde o episódio anterior de sangramento. Apresenta-se taquicárdico, hipotenso e icterico (I+/IV), com um nível de consciência rebaixado (Glasgow 10). Em relação a este caso clínico, assinale a assertiva correta:

- A) O tamponamento com balão de Sengstaken-Blakemore pode ser considerado como conduta inicial neste paciente.
- B) O uso de inibidor de bomba de prótons para este paciente só estaria indicado se houvesse história de uso de antiagregantes plaquetários.
- C) O objetivo da terapia farmacológica neste paciente é promover uma redução da hipertensão portal a partir da indução de uma vasoconstrição esplâncnica.
- D) Uma reposição volêmica vigorosa adequada com cristalóides melhora a perfusão cerebral e conseqüentemente o nível de consciência, descartando a necessidade de uma via aérea definitiva.

21 - Com relação aos cânceres epiteliais de ovário, dentre as alternativas abaixo, NÃO estaria correto afirmar que:

- A) A linfadenectomia pélvica e para-aórtica deve sempre ser realizada.
- B) Devemos realizar pesquisa de mutação do BRCA em toda paciente com diagnóstico de carcinoma epitelial não mucinoso de ovário.
- C) Nos casos em que se planeja tratamento neoadjuvante, biópsia guiada por imagem ou por laparoscopia deve ser obtida antes de iniciar o tratamento quimioterápico a fim de excluir tumores de outros sítios, por exemplo, do trato digestivo.
- D) O estadiamento cirúrgico envolve a coleta do líquido ascítico ou lavado peritoneal, inspeção de toda a cavidade

peritoneal, histerectomia total, salpingo-ooforectomia bilateral, omentectomia, remoção de áreas suspeitas ou, se não houver, biópsias randômicas da superfície peritoneal incluindo as goteiras parietocólicas e a área diafragmática.

22 – L.V., 23 anos, procura o ambulatório com queixa de nódulo de mama de aparecimento nos últimos quatro meses, indolor e que foi notado pelo seu companheiro. Nega história de câncer na família e já tem dois filhos de parto normal. Ao exame: nódulo móvel, indolor, limites precisos e de consistência fibroelástica. Sem outras alterações, ao exame físico. A melhor conduta neste caso deve ser realizar:

- A) Mamografia e punção por agulha fina
- B) USG mamária e punção por agulha fina
- C) Acompanhamento clínico sem necessidade de biópsia
- D) Ressonância nuclear magnética com contraste e biópsia guiada por ressonância

23 - Mulher com 59 anos refere ter apresentado três episódios de sangramento vaginal em pouca quantidade e de coloração escura no último ano. Diz também estar utilizando terapia de reposição hormonal de uso contínuo desde a menopausa, que ocorreu aos 52 anos. Qual o método propedêutico mais adequado para a elucidação diagnóstica?

- A) Histeroscopia com biópsia.
- B) Biópsia aspirativa de endométrio.
- C) Curetagem uterina.
- D) Ultrassonografia pélvica transvaginal.

24 - É indubitável que o tratamento adjuvante resulta em benefícios substanciais para uma boa parte das mulheres com câncer de mama inicial. Entretanto, relativamente pouca atenção tem sido dada à incidência e ao manejo de toxicidades tardias, sobretudo relacionadas ao tratamento quimioterápico. Efeitos adversos que podem se manifestar muito tempo depois do tratamento devem ser reconhecidos e monitorados. Com relação ao citado, o que NÃO seria correto afirmar?

- A) Gravidez depois do tratamento de câncer de mama não está associada a pior prognóstico.
- B) É importante enfatizar que ausência de menstruação é equivalente de infertilidade.
- C) Falência ovariana prematura induzida pela quimioterapia é uma toxicidade importante para mulheres na pré-menopausa. Pode ser caracterizada como amenorreia temporária ou permanente, o que geralmente depende da idade da paciente, do tipo e da duração desta.
- D) A cardiotoxicidade por antracíclicos pode ter forma aguda ou subaguda. No entanto, na maioria os casos são de instalação tardia (> 1 ano após a conclusão do tratamento), tendendo a ser irreversíveis e relacionados à dose cumulativa de antracíclicos administrada.

25 - A gravidez ectópica geralmente se encontra associada a fatores de risco. Qual dos fatores abaixo qual não esta relacionado com o aumento crescente desta patologia?

- A) Cirurgia tubária prévia.
- B) Uso de dispositivo intrauterino.
- C) Ocorrência de adenomiose.
- D) Anticoncepção de emergência com levonogestrel.

26 – Mulher de 27 anos traz o resultado do seu novo exame citopatológico de colo uterino, coletado há 30 dias, cujo laudo está descrito abaixo. Seu primeiro exame citopatológico foi há um ano, que estava normal e encontra-se anexado em seu prontuário.

- Células do epitélio pavimentoso, na maioria intermediárias, sem atipias.
- Presença de células metaplásicas.
- Alguns grupamentos de células colunares endocervicais.
- Alguns leucócitos.
- Flora bacteriana tipo Döderlein.
- Ausência de células malignas no material examinado.

Diante desse resultado e de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, qual a conduta correta?

- A) Indicar colposcopia devido à presença de células metaplásicas.
- B) Orientar novo citopatológico em um ano, por se tratar de exame normal.
- C) Coletar novo citopatológico após tratamento de infecção vaginal evidenciada no exame.
- D) Orientar novo citopatológico em três anos, por se tratar de exame normal.

27 – Com relação ao câncer de mama e do ovários hereditários, assinale aquela que for INCORRETA.

- A) Mulheres aos 70 anos com mutações deletérias no BRCA1 apresentam risco de 90% câncer de mama, 80% de

risco de câncer de ovário e 70% de risco de desenvolverem câncer de mama contralateral.

B) Mulheres portadoras de mutações deletérias no gene BRCA2 apresentam aos 70 anos risco de 55% de câncer de mama, 16,5% de câncer de ovário e 62% de câncer de mama contralateral.

C) Podem estar associados a outros tumores, como câncer de pâncreas e câncer de próstata em homens jovens.

D) Está indicado teste genético para os genes BRCA1 e BRCA2 em descendentes de judeus Ashkenazy.

28 – Qual a causa mais comum de crescimento intrauterino restrito tardio?

A) Anormalidades cromossômicas.

B) Insuficiência placentária.

C) Malformações congênitas.

D) Alterações genéticas.

29 - Menina de 17 anos com amenorreia primária e desenvolvimento normal dos caracteres sexuais secundários foi submetida ao teste do progestogênio o qual foi negativo. Em seguida, realizou-se estímulo com estrogênio + progestágeno e também não houve sangramento. Qual a hipótese diagnóstica?

A) Disgenesia gonadal pura.

B) Síndrome dos ovários policísticos.

C) Síndrome de Rokitansky.

D) Síndrome de Turner.

30 - Em relação ao pico ovulatório do LH, é verdadeiro afirmar que os seguintes eventos podem estar associados:

I. Aumento da produção androgênica pelas células granulosas dos folículos terciários.

II. Aumento da descamação de células eosinófilas do epitélio estratificado cérvico-vaginal.

III. Aumento de mucina no muco cervical

IV. Aumento da tortuosidade das glândulas do endométrio funcional

V. Aumento da androstenodiona nas células tecais de folículos primários recrutados

A) II e V apenas.

B) III e IV apenas.

C) I, III e V apenas.

D) II, III e IV apenas.

31 -Recém nascido com 28 dias de vida, icterico desde o nascimento, sempre com predomínio de bilirrubina indireta, reticulócitos de 2%, hemoglobina de 12,5 e volume globular de 37, sem hepatoesplenomegalia, exame físico sem alterações. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

A) Síndrome de Gilbert.

B) Síndrome de Crigler Najjar.

C) Icterícia fisiológica prolongada.

D) Deficiência de glicose-6-fosfatodesidrogenase.

32 - Escolar de 6 anos apresenta-se há um dia com quadro de febre elevada, tosse, dor de garganta, dor abdominal, diarreia e cefaleia. Ao exame observa-se exsudato em tonsilas, enantemas, adenomegalia cervical não dolorosa, hiperemia conjuntival e rouquidão. Inicialmente deve-se tratar este paciente com:

A) Sintomáticos.

B) Amoxicilina via oral.

C) Prednisona via oral.

D) Penicilina benzatina.

33 -A oxiúriase é causada pelo parasita _____ sendo o _____ seu(s) reservatório(s) e a resistência dos ovos em ambiente doméstico dura cerca de _____ semanas.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) *Trichuris trichiura* – homem e o cão – seis

B) *Enterobius vermicularis* – homem – três

C) *Trichuris trichiura* – cão – seis

D) *Enterobius vermicularis* – cão – seis

34 - Lactente de cinco meses chega ao setor de emergência com quadro de dificuldade respiratória que se iniciou há três dias e pior nas últimas 12 horas. Apresenta ausculta pulmonar com estertores crepitantes difusos, raros sibilos expiratórios, ausculta cardíaca normal. Saturação em oximetria de pulso em ar ambiente de 86%. Raio X de tórax com infiltrado peribrônquico bilateral, hiperinsuflação difusa. Ausculta cardíaca sem alterações. Afebril no momento. Sobre esta doença, assinale as alternativas que se

encontram corretas.

- I. O uso rotineiro de nebulização com solução salina hipertônica diminui a gravidade e taxa de internação.
- II. O uso de corticosteroides sistêmicos está indicado nos pacientes com história de atopia.
- III. Pode-se tentar um teste terapêutico com beta-2 adrenérgico inalatório.
- IV. Deve ser mantido em jejum até melhora da dificuldade respiratória.

- A) III apenas.
B) I e II apenas.
C) II e III apenas.
D) II e IV apenas.

35 - O ponto crítico para o sucesso da reanimação neonatal é o estabelecimento adequado da ventilação. Quando após a realização dos passos iniciais em 30 segundos o recém-nascido apresenta apneia devemos:

- A) Fornecer oxigênio inalatório a 100%.
B) Ofertar ventilação com pressão positiva.
C) Proceder imediata intubação traqueal.
D) Iniciar com compressão torácica e ventilação.

36 - No exame de rotina de um lactente de quatro meses com dificuldade de ganho ponderal você observa presença de um sopro cardíaco holossistólico de regurgitação, mais audível entre o terceiro e quarto espaços intercostais esquerdos, irradiando-se em faixa para a direita, e segunda bulha hiperfonética na área pulmonar. Na radiografia de tórax observa-se aumento da circulação pulmonar com cardiomegalia a custa das cavidades esquerdas. O diagnóstico mais provável é:

- A) Tetralogia de Fallot.
B) Estenose pulmonar.
C) Persistência do canal arterial.
D) Comunicação interventricular.

37 - Qual a alternativa correta em relação à dermatite atópica na infância?

- A) É uma doença inflamatória aguda da pele que afeta um terço das crianças.
B) A maioria dos pacientes desenvolve a doença após os 5 anos.
C) Em muitos pacientes, que desenvolverão rinite alérgica e/ou asma, é a primeira manifestação de atopia.
D) Em lactentes e crianças pequenas, não há um padrão característico de distribuição das lesões, podendo ocorrer em qualquer parte do corpo.

38 - Menina, 9 anos de idade, previamente hígida, consulta na unidade de saúde por febre de 39°C, cansaço, cefaleia e dor abdominal leve presentes há 5 dias. Suas conjuntivas estão um pouco ictéricas, mas não há alterações na pele. Na oroscopia, há presença de lesões petequiais no palato e exsudato branco-acinzentado e sem placas na orofaringe. Há aumento de linfonodos cervicais bilaterais. A ausculta torácica é inocente, e observa-se hepatomegalia. Suas fezes e urina são normais. Desse modo, o mais provável agente causador desse quadro é:

- A) Estreptococo beta-hemolítico.
B) Estreptococo do grupo A.
C) Citomegalovírus humano.
D) Vírus da rubéola.

39 – O comportamento característico de uma criança de _____ meses incompletos é usar as mãos, as colocando frequentemente na boca, junto com roupas e qualquer outro objeto ao seu alcance. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 0 a 3
B) 3 a 6
C) 6 a 9
D) 9 a 12

40 – Pré-escolar de 2 anos apresenta-se com tumoração indolor, em região cervical, observada pela mãe durante o banho. Ao exame lesão cística em linha média, que move-se cranialmente com a deglutição ou protrusão da língua. O diagnóstico mais provável é:

- A) Cisto branquial.
B) Tireoide ectópica.
C) Cisto tireoglosso.

D) Linfadenopatia infecciosa.

41 - Os levantamentos estatísticos mostram atualmente que os danos causados pela iatrogenia são alarmantes, frutos do sobrediagnóstico e sobretratamento. Com base no “primum non nocere” hipocrático surgiram vários movimentos alertando sobre os excessos de intervenções. Entre esses, ChoosenWisely, Slow Medicine, RightCare Alliance e, especialmente, a Prevenção Quaternária, que pode ser conceituada como ação para:

- A) Tratar pacientes portadores de um agravo não detectado em prevenção primária, secundária e terciária.
- B) Detectar um problema de saúde em estágio inicial em um indivíduo ou população, facilitando, dessa forma, a cura, ou reduzindo sua progressão.
- C) Reduzir os efeitos crônicos de um problema de saúde em um indivíduo ou população, minimizando o prejuízo funcional em consequência de problema de saúde agudo ou crônico.
- D) Identificar paciente ou população em risco de supermedicalização, para protegê-los de uma intervenção médica invasiva e sugerir procedimentos científica e eticamente aceitáveis.

42 - Ao iniciar sua atividade em uma Unidade de Saúde da Família um médico recebe a informação que no território onde atua estão ocorrendo vários casos de Sífilis Neonatal. Ele decide reforçar com os profissionais de todas as equipes da unidade a utilização no pré-natal de um teste de diagnóstico para a sífilis. A principal característica deste teste diagnóstico deve ser:

- A) Alta sensibilidade.
- B) Alta especificidade.
- C) Valor preditivo negativo elevado.
- D) Razão de probabilidade positiva baixa.

43 - No estudo _____, as variáveis são todas medidas uma única vez, sem distinção estrutural entre as preditoras e as de desfecho. Elas têm grande valor, pois fornecem informações descritivas sobre _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) de coorte – incidência
- B) transversal – incidência
- C) transversal – prevalência
- D) de ensaio clínico – causalidade

44 – Um morador de um município brasileiro de 20.000 habitantes procurou a Unidade Básica de Saúde, tendo sido acolhido de forma competente, uma vez diagnosticado como portador de diabetes mellitus iniciou o tratamento. Porém, quando necessitou de atendimento especializado por médico endocrinologista foi informado que esse atendimento não estava disponível naquele município e não havia possibilidade de encaminhá-lo para outra cidade.

Assinale o princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde que está comprometido na situação relatada.

- A) Equidade.
- B) Integralidade.
- C) Universalidade.
- D) Hierarquização.

45 –Em relação ao viés em pesquisas clínicas, analise as assertivas abaixo, conforme descrito por Fletcher (2006):

- I. O viés de seleção ocorre quando são feitas comparações entre grupos de pacientes que diferem em outros determinantes do desfecho, além do que está sendo estudado.
- II. O viés de aferição ocorre quando os métodos de aferição são iguais entre os grupos de pacientes.
- III. O viés de confusão ocorre quando dois fatores estão associados e seus efeitos não se confundem.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

46 -Qual das situações abaixo constitui contraindicação às vacinas de bactérias ou vírus atenuados na infância?

- A) Desnutrição.
- B) Doença neurológica com sequela.
- C) Uso de 2 mg/Kg/dia de prednisona durante os últimos 15 dias.
- D) Impetigo.

47 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com os códigos de ética dos profissionais da saúde, deve ser garantido aos adolescentes, nos Serviços de Saúde, direito ao sigilo e à privacidade no seu acesso:

- A) Desde que acompanhados por pais ou responsáveis.
- B) Exceto nas questões de saúde sexual e reprodutiva.
- C) Inclusive nas questões de saúde sexual e reprodutiva, independentemente de possíveis danos ao paciente ou a outros.
- D) Em qualquer questão, desde que a não revelação não acarrete dano ao paciente ou de outros. Se houver quebra de sigilo, o adolescente obrigatoriamente deverá ser informado.

48 - Homem, 20 anos, vem apresentando um isolacionismo crescente, com descuido de sua aparência e fumando cerca de três carteiras de cigarro por dia. Apresenta condutas que são descritas pelos familiares como estranhas, com ideias de que vem sendo perseguido e de que seres de outro planeta vem se comunicando com ele através de ondas que invadem a sua mente. Em função do provável diagnóstico, a conduta terapêutica psicofarmacológica mais adequada seria iniciar com:

- A) Sertralina.
- B) Carbonato de lítio.
- C) Clozapina.
- D) Clonazepam.

49 - A mortalidade infantil pós-neonatal tem forte relação com:

- A) Atenção ao parto.
- B) Controle de infecção hospitalar.
- C) Acompanhamento pré-natal.
- D) Falta de saneamento básico.

50 - A mamografia em mulheres com mais de 40 anos apresenta sensibilidade e especificidade em torno de 75% e 94%, respectivamente, para câncer de mama. Isso mostra a possibilidade de o exame apresentar

- A) 25% dos falsos positivos.
- B) 75% dos verdadeiros negativos.
- C) 94% dos verdadeiros negativos.
- D) 75% dos falsos positivos.